



# 談談預防

## 迷幻藥－揭開難以理解 圍繞這危險的毒品

發行第 5 期

CSAP'S WESTERN 中心為預防技術的應用。

JULIE HOGAN, PH.D. 董事

按照 Diane Glass, 預防應用的管理籌劃人, 編輯 Kris Gabrielsen, 助理董事

在最近的調查報告超過一半以上的家長(百分之52)渴望得到有關狂喜毒品的資訊<sup>1</sup>。這談談預防的通訊是企圖揭開難以理解的和陳述一些基本事實關於這危險的, 不合法的毒品。

根據 2003 年十月所得的調查, 在美洲九個青少年中的一個曾嘗試過迷幻約最少一次<sup>2</sup>。

記得:

*使用毒品是一種決定-父母能音響的決定*

迷幻藥有兩種(苯丙胺 amphetamine-like)和致幻藥 (LSD-like) 物。這毒品有藥丸形狀像阿司匹林的大小。使用這藥丸能引起很多副作用如變得枯乾, 發羊吊, 發燒, 肌肉破壞, 或中風。父母需要知道關聯使用迷幻藥全部有關的物件。下面的物品似乎無所謂, 但可能與使用這毒品有關聯:

- 橡皮奶頭和棒棒糖能用來幫助防衛非故意的顎敲響牙齒磨損。
- 糖果項鏈能用來隱藏迷幻藥。
- 光輝的棍子, 薄荷膠和口罩使用迷幻藥時能用來多刺激感覺當<sup>3</sup>。

## 欲知更多資訊請致電：

美國教育部提供基金，健康和人類服務，濫用物質精神健康服務管理，預防濫用物質中心

## 想一想...

- . • 在2001-2002之間二百六十萬青少年被報告經驗到迷幻藥<sup>4</sup>。
- . • 身為家長你最好的自衛是好的進攻，教育自己有關迷幻藥毒品。
- . • 你是否和你的青少年一起慶祝當他、她決定不使用毒品？

### 行動的步驟：

- 父母管理和問你的青少年以下四個問題能影響他們圍繞使用毒品的決定：
  - ◆ 你與誰在一起？
  - ◆ 你將要做什麼？
  - ◆ 你要去哪里？
  - ◆ 你何時回家？

## 根源之處：

1 Partnership for Drug Free America. (2003, October). *Partnership Attitude Tracking Study (PATS)*. New York: Author.

2 Partnership for Drug Free America. (2002). *Teen Survey*. New York: Author.

3 Partnership for Drug Free America. (2003). *What Parents Should Know About Ecstasy*. (Brochure). New York: Author.

4 Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2003). *Results from the 2002 National Survey on Drug Use and Health: National Findings* (Office of Applied Studies, NHSDA Series H-22, DHHS Publication No. SMA 03-3836). Rockville, MD: Author.